

E-cigareta 20 mg/ml nikotinové soli
Obsahuje: Nikotin Číslo CAS: 54-11-5, číslo ES:
200-193-3

Toxický při požití.

V případě potřeby lékařské pomoci mějte po ruce obal nebo štítek.

Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 18ti let.

Po použití si důkladně umyjte ruce.

PŘI INTOXIKACI: Okamžitě volejte lékaře TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA.

Uchovávejte pod zámekem.

Obsah/kontejner odevzdejte na schválené sběrné místo.



Návod k použití

Jednorázová elektronická cigareta / jednorázová cigareta.

Elektronickou cigaretu používejte s maximální opatrností a

dodržujte bezpečnostní upozornění na obalu a štítku. V

případě kontaktu s kůží kontaminované místo důkladně

opláchněte vodou. Pokud dojde ke kontaminaci oděvu

kapalinou, oděv okamžitě svlékněte a před dalším použitím

vyberte. Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody a

vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí je několik minut důkladně vyplachujte s

otevřenými víčky a vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek by

měl být skladován na chladném, dobře větraném místě mimo

dosah dětí a mladistvých mladších 18ti let. Výrobek by neměl

být skladován s potravinami, krmivem nebo léčivem.

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete celý návod k použití. Přístroj Aroma King není vhodný pro následující osoby: Mladí lidé do 18 let, nekuřáci, těhotné nebo kojící ženy a osoby ve špatném zdravotním stavu.

1. Návod k použití a skladování

- Nikotinové soli jsou speciálním přípravkem používaným v zařízeních s nízkou účinností.

- Nikotinové soli poskytují vysokou koncentraci nikotinu a jsou k dispozici v dávkách 10 mg a 20 mg.

- Nikotinové soli jsou navrženy tak, aby i při vysoké koncentraci nikotinu zanechávaly na patře jemnější chuť.

- Nezkoušení uživatelé by se měli seznámit s následujícími body a začít s nízkou koncentrací nikotinu.

2. Kontraindikace a 3. upozornění pro skupiny spotřebitelů.

UPOZORNĚNÍ a OPATŘENÍ

Výrobky obsahující nikotin se nedoporučují pro:

- Nekuřáky.

- Mladistvé (do 18 let).

- Těhotné nebo kojící ženy kvůli nikotinu o kterém je známo, že prochází do placenty a je předáván s mateřským mlékem.

- Lidé ve špatném zdravotním stavu, s např. onemocněním srdce, žaludku a močových cest. Dvanáctník vřed, problémy s játry nebo ledvinami, dlouhodobé problémy s krkem nebo problémy s dýcháním způsobené Bronchitidou, emfyzémem nebo astmatem.

- Lidé s hypertenzí nebo feochromocytomu (nádor žlučníku, nadledvinek), kteří trpí vysokým krevním tlakem.

- Lidé, kteří mají cukrovku, protože nikotin může ovlivnit hladinu cukru v krvi

- Lidé, kteří užívají následující léky:

- Teofylin (používá se k léčbě dýchacích potíží).

- Ropinirol (používá se k léčbě syndromu neklidných nohou)

- Klozapon (používaný k léčbě schizofrenie)

4. informace o možných vedlejších účincích na zdraví MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Nadměrné užívání nebo konzumace nikotinu může způsobit následující nežádoucí účinky:

- Mdloby, slabost

- Nevolnost (zvracení)

- bolest hlavy

- kašel

- Podráždění úst nebo krku

- závratě

- Nepříjemné pocity v žaludku

- škytavka

- Ucpaní nosu

- zvracení (nevolnost)

- palpitace

- poruchy srdečního rytmu

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedené v tomto letáku, nepokračujte v užívání tohoto přípravku. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, kontaktujte svého lékaře. Lékaři předložte tento příbalový leták.

5. Informace o návykových účincích

Nikotin je vysoce návykový, a proto je určen pouze pro dospělé.

Léčba nikotinismu je dlouhodobá a obtížná - nepoužívejte přípravky obsahující tuto látku. Pokud potřebujete pomoc při odvykání nikotinu, obraťte se na svého lékaře.

Vlastnosti produktu – Obsah balení: 1x zařízení AROMA KING DEVICE, 1x návod k obsluze, 550 mAh (integrovaná baterie), Přibližně 700 potáhnutí z cigarety 57 pg nikotinu na jeden šluk.

6. Toxikologické údaje

Nikotin je silný toxin. I malá dávka má na tělo účinek.

Toxikologické údaje o nikotinu:

Složka	Způsob expozice		
	Potraviný (orální)	Kůže	Vdechování
Propylenglykol	Letální dávka pro polovinu studované populace (LD50): 22 000 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na potkanech)	Smrtečná dávka pro polovinu studované populace (LD50): > 2 000 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na králících)	Smrtečná koncentrace pro polovinu testované populace (LC50) > 317 042 mg/m ³ vzduchu po dobu 2 hodin (testováno na králících)
Glycerol	Letální dávka pro polovinu studované populace (LD50): 27 200 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na potkanech)	Smrtečná dávka pro polovinu studované populace (LD50): 56 750 mg/kg tělesné hmotnosti (testováno na morčatech)	Smrtečná koncentrace pro polovinu testované populace (LC50) > 2,75 mg/l vzduchu po 4 hodinách (testováno na potkanech)
Nikotin	Orální: ATE = 5 mg/kg tělesné hmotnosti	Dermální: ATE = 70 mg/kg tělesné hmotnosti	Inhalační: ATE = 0,19 mg/l (prach nebo mlha)

Nikotin se velmi rychle vstřebává do těla nejen plicemi, ale i kůží.
JAK ULOŽIT ZAŘÍZENÍ: Přístroj skladujte při teplotě do 25 °C na čistém a suchém místě. Uložení: Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Národní toxikologická informační služba:
+420 22 49 645 32, + 420 224 964 629,
+420 22 49 192 93

7. Kontaktní údaje výrobce/dovozce

Symetricus Sp z o. o., Plac Wolnosci 4, 40-078
Katowice, Poland
+48 505 804 485, info@symetricus.com

